

**Université Moulay Ismaïl**  
**Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers — Meknès**

**CONCOURS D'ENTREE en 1ère Année**

Filière : Sciences Mathématiques A et B

**Epreuve de Mathématiques**

Jeudi 26 Juillet 2012 - Durée : 2h 00mn

**|| Questions à réponse précise, Partie A ||**

**NB : Chaque question est notée sur (1Pt)**

Questions	Réponses
Trouver la période $T$ de la fonction suivante : $f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right) + \cos(x)$	
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\cos^4(4x) - \sin^4(4x) = 1$	
Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $(1+i)^9 = a+ib$	
Calculer $C = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \sqrt{\frac{n+1}{n-1}}$	
Soit $f$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ , calculer la dérivée de $g(x) = \exp((f(x^2))^2)$	
Soit $E = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$ avec $x \in E$ , trouver $f(E)$	
Trouver les maximums et les minimums de la fonction $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) =  x^2 - x  +  x $	
On donne les points $A(1,2)$ , $B(-2,1)$ et $C(0,4)$ . Déterminer l'angle $\widehat{BAC}$ en radian	
Soit $x$ un réel positif. Combien y-a-t-il d'entiers naturels multiples de 3 entre 0 et $x$ ?	
Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de $X^5 - 7X^4 - X^2 - 9X + 9$ par $X^2 - 5X + 4$	

**|| Questions à réponse précise, Partie B ||**

**NB : Chaque question est notée sur (2Pts)**

Questions	Réponses
<p>Soit <math>f : [a, b] \rightarrow I\!\!R</math> une fonction continue telle que  <math>\forall x \in [a, b], f(a+b-x) = f(x)</math>. on pose <math>I = \int_a^b f(x)dx</math>  et <math>J = \int_a^b xf(x)dx</math>. Calculer <math>J</math> en fonction <math>I</math>.</p>	
<p>Soit <math>E</math> un ensemble, et <math>A, B</math> deux sous ensembles de <math>E</math>. On appelle différence symétrique de <math>A</math> et <math>B</math>, notée <math>A\Delta B</math>, le sous-ensemble de <math>E</math> : <math>A\Delta B = \{x \in A \cup B / x \notin A \cap B\}</math>. Calculer <math>A\Delta E</math> et <math>A\Delta C_E^A</math></p>	
<p>Le périmètre d'un triangle isocèle vaut 1. Déterminer les dimensions de ce triangle pour que son aire soit la plus grande possible.</p>	
<p>On note <math>u_n = 25^n + 2^{3n+4}</math>. Trouver <math>a, b \in \mathbb{Z}</math> tels que <math>\forall n \in I\!\!N, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n</math></p>	
<p>Calculer <math>D = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 - 2} dx</math></p>	
<p>Pour <math>n \in I\!\!N^*</math>, on pose <math>S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2</math>. Soit <math>k</math> un entier compris entre 1 et <math>n</math>. Utiliser l'égalité <math>(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1</math> pour calculer <math>S_n</math>.</p>	
<p>Soit <math>x</math> un réel et <math>E(x)</math> la partie entière de <math>x</math>. Déterminer</p> $F = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{E(x) + E(2x) + E(3x) + \dots + E(nx)}{n^2}$	
<p>De combien de façon peut-on payer 10 DHS avec des pièces de 10 et 20 centimes ? ( 1 DH = 100 centimes)</p>	
<p>Soient <math>x_1, x_2</math> et <math>x_3</math> les racines de <math>x^3 + 2x - 1 = 0</math>, calculer <math>X = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3</math></p>	
<p>Le 1<sup>er</sup> juin 2012, les participants d'un club d'astronomie ont observé le corps céleste <math>\mathcal{A}</math> qui apparaît tout les 51 jours. Le 28 juin 2012, ils ont observé le corps céleste <math>\mathcal{B}</math>, qui apparaît tout les 72 jours. A quelle date devront-ils fixer une nouvelle réunion pour observer simultanément les deux corps?</p>	
<p>Déterminer un cercle de centre <math>\Omega</math> et de rayon <math>R</math> tangent aux trois droites d'équations respectives :</p> $y = 2x + 1, y = 2x + 7 \text{ et } y = -\frac{1}{2}x$	

Université Moulay Ismaïl  
**Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers — Meknès**

**CONCOURS D'ENTREE en 1ère Année**

Filière : Sciences Mathématiques A et B

**Epreuve de Mathématiques**

Jeudi 26 Juillet 2012 - Durée : 2h 00mn

**Questions à réponse précise, Partie A**

**NB : Chaque question est notée sur (1Pt)**

Questions	Réponses
Trouver la période $T$ de la fonction suivante : $f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right) + \cos(x)$	$f(x+4\pi) = \sin\left(2\pi + \frac{x}{2}\right) + \cos(x+4\pi)$ $= f(x)$ $\Rightarrow T = 4\pi$
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\cos^4(4x) - \sin^4(4x) = 1$	$S = \left\{ \frac{k\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $(1+i)^9 = a+ib$	$a = b = 16$
Calculer $C = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \sqrt{\frac{n+1}{n-1}}$	$C = +\infty$
Soit $f$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ , calculer la dérivée de $g(x) = \exp((f(x^2))^2)$	$g'(x) = 4x f'(x^2) \cdot f'(x^2) g(x)$
Soit $E = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$ avec $x \in E$ , trouver $f(E)$	$f(E) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
Trouver les maximums et les minimums de la fonction $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) =  x^2 - x  +  x $	$\max_{x \in [-1, 1]} f(x) = 3$ $\min_{x \in [-1, 1]} f(x) = 0$
On donne les points $A(1,2)$ , $B(-2,1)$ et $C(0,4)$ . Déterminer l'angle $\widehat{BAC}$ en radian	$\cos BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = 0,02$ $\widehat{BAC} = 1,55 \text{ rad}$
Soit $x$ un réel positif. Combien y-a-t-il d'entiers naturels multiples de 3 entre 0 et $x$ ?	Le nombre des entiers multiples de 3 entre 0 et $x$ est : $E\left(\frac{x}{3}\right) + 1$
Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de $X^5 - 7X^4 - X^2 - 9X + 9$ par $X^2 - 5X + 4$	Le quotient : $x^3 - 2x^2 - 14x - 63$ Le reste : $-268x + 261$

|| Questions à réponse précise, Partie B ||

**NB : Chaque question est notée sur (2Pts)**

Questions	Réponses
<p>Soit <math>f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}</math> une fonction continue telle que <math>\forall x \in [a, b], f(a+b-x) = f(x)</math>. on pose <math>I = \int_a^b f(x) dx</math> et <math>J = \int_a^b xf(x) dx</math>. Calculer <math>J</math> en fonction <math>I</math>.</p>	$\begin{aligned} u &= a+b-t \\ J &= \int_a^b x f(u) du = \int_b^a (a+b-t) f(t) dt \\ &= (a+b)I - J \\ \Rightarrow J &= \frac{a+b}{2} I \end{aligned}$
<p>Soit <math>E</math> un ensemble, et <math>A, B</math> deux sous ensembles de <math>E</math>. On appelle différence symétrique de <math>A</math> et <math>B</math>, notée <math>A\Delta B</math>, le sous-ensemble de <math>E</math> : <math>A\Delta B = \{x \in A \cup B / x \notin A \cap B\}</math>. Calculer <math>A\Delta E</math> et <math>A\Delta C_E^A</math></p>	$\begin{aligned} A\Delta E &= (A \cup E) \setminus (A \cap E) = E \setminus A = \bar{A} \\ A\Delta C_E^A &= A \Delta (A \cup E \setminus A) = A \Delta E = \bar{A} \end{aligned}$
<p>Le périmètre d'un triangle isocèle vaut 1. Déterminer les dimensions de ce triangle pour que son aire soit la plus grande possible.</p>	<p>On a <math>S(n) = \left(\frac{1}{2} - n\right)\sqrt{n - \frac{1}{4}}</math> et sur <math>\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]</math></p> $S'(n) = \frac{1-3n}{\sqrt{4n-1}}, S'(n)=0 \Leftrightarrow n = \frac{1}{3}$ $AB = AC = BC = \frac{\sqrt{3}}{3}$
<p>On note <math>u_n = 25^n + 2^{3n+4}</math>. Trouver <math>a, b \in \mathbb{Z}</math> tels que <math>\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n</math></p>	$a = 33 \quad \text{et} \quad b = -200$
<p>Calculer <math>D = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 - 2} dx</math></p>	$D = \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} - 1)$
<p>Pour <math>n \in \mathbb{N}^*</math>, on pose <math>S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2</math>. Soit <math>k</math> un entier compris entre 1 et <math>n</math>. Utiliser l'égalité <math>(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1</math> pour calculer <math>S_n</math>.</p>	$S_n = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
<p>Soit <math>x</math> un réel et <math>E(x)</math> la partie entière de <math>x</math>. Déterminer</p> $F = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{E(x) + E(2x) + E(3x) + \dots + E(nx)}{n^2}$	$F = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{u}{2}$
<p>De combien de façon peut-on payer 10 DHS avec des pièces de 10 et 20 centimes ? (1 DH = 100 centimes)</p>	$(0, 50); (1, 49); \dots; (50, 0), \text{ Par suite le nombre de façon est : 55 façons}$
<p>Soient <math>x_1, x_2</math> et <math>x_3</math> les racines de <math>x^3 + 2x - 1 = 0</math>, calculer <math>X = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3</math></p>	$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 3$
<p>Le 1<sup>er</sup> juin 2012, les participants d'un club d'astronomie ont observé le corps céleste <math>A</math> qui apparaît tout les 51 jours. Le 28 juin 2012, ils ont observé le corps céleste <math>B</math>, qui apparaît tout les 72 jours. A quelle date devront-ils fixer une nouvelle réunion pour observer simultanément les deux corps?</p>	<p>On pourra observer simultanément les deux corps le:</p> <p style="text-align: center;">31 octobre 2012</p>
<p>Déterminer un cercle de centre <math>\Omega</math> et de rayon <math>R</math> tangent aux trois droites d'équations respectives :</p> $y = 2x + 1, y = 2x + 7 \text{ et } y = -\frac{1}{2}x$	$\begin{aligned} \Omega(-1, 2) \text{ et } R = \frac{3\sqrt{5}}{5} \\ \Omega\left(-\frac{11}{5}, -\frac{2}{5}\right) \text{ et } R = \frac{3\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$